

# endorus

Mentha piperita 4CH + Associação



## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**Nome comercial:** Endorus

**Insumos ativos:** Mentha piperita, Colocynthis, Magnesia phosphorica, Matricaria chamomilla

**Medicamento Homeopático**

## APRESENTAÇÕES

**Apresentação comercial:**

Frasco de vidro âmbar contendo 10mL, com gotejador atóxico + seringa dosadora.

**Forma farmacêutica:** Solução oral

**Via de administração:** ORAL

## USO PEDIÁTRICO

## COMPOSIÇÃO

**Cada mL contém:**

|                            |           |        |
|----------------------------|-----------|--------|
| Mentha piperita .....      | 4CH ..... | 0,25mL |
| Colocynthis .....          | 6CH ..... | 0,25mL |
| Magnesia phosphorica ....  | 6CH ..... | 0,25mL |
| Matricaria chamomilla .... | 6CH ..... | 0,25mL |

Veículo: álcool de cereais

33 gotas equivalem a, aproximadamente, 1mL do medicamento.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

ENDORUS é indicado como auxiliar no alívio do desconforto causado por cólicas abdominais flatulentas em recém-nascidos e crianças.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

ENDORUS tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que despertam as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas do desconforto causado por cólicas abdominais flatulentas em recém-nascidos e crianças.

A cólica é caracterizada pela duração diária total de irritabilidade, agitação ou choro do bebê durante pelo menos três horas por dia, por mais de três dias na semana, em pelo menos três semanas, em crianças saudáveis e bem alimentadas.

O bebê chora de forma inconsolável, sem uma causa identificável e com exame físico normal. Esse problema usualmente surge na segunda semana de vida, intensifica-se entre a quarta e a sexta semana e gradativamente alivia, desaparecendo, geralmente, até o terceiro mês de vida. <sup>1,2,3 e 4</sup>

**Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do ENDORUS:**

**Colocynthis:** Atua como auxiliar no tratamento da cólica abdominal.

**Magnesia phosphorica:** Atua como auxiliar no tratamento das cólicas flatulentas nas crianças e recém-nascidos e inchaço abdominal.

**Matricaria chamomilla:** Atua como auxiliar no tratamento de cólicas flatulentas e irritabilidade nas crianças e abdômen distendido.

**Mentha piperita:** Atua como auxiliar no tratamento da cólica abdominal nos bebês e crianças e abdômen distendido.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Até o momento, são desconhecidas outras contraindicações do medicamento ENDORUS.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Evite gotejar sob a língua, pois pode causar ardência devido à presença de álcool. Álcool = 0,0084 g/gota.

**AO DILUIR A DOSE A SER ADMINISTRADA EM ÁGUA CONFORME POSOLOGIA SUGERIDA NESTA BULA, A GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DO MEDICAMENTO É REDUZIDA À ZERO, O QUE PERMITE O USO SEGURO PARA AS FAIXAS ETÁRIAS RECOMENDADAS.**

Até o momento, são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento ENDORUS. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações. Após aberto, válido por 24 meses.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: líquido, incolor e com odor alcoólico. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como, por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão etc.



HEBRON



## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração: Via oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada.

O uso por outras vias é proibido. Posologia sugerida:

**Recém-nascidos até 3 meses:** Diluir 1 gota em 5mL de água e administrar de 6 em 6 horas, preferencialmente antes de cada mamada, ou conforme orientação médica.

**Crianças até 2 anos:** Diluir 2 gotas em 10mL de água e administrar de 6 em 6 horas, preferencialmente antes de cada mamada, ou conforme orientação médica.

| Faixa etária                | Quantidade de água para diluição | Quantidade do medicamento |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Recém-nascidos até 3 meses: | 5mL                              | 1 gota                    |
| Crianças até 2 anos:        | 10mL                             | 2 gotas                   |


### Instruções para o uso do medicamento:

**Etapa 1:** Utilizando a seringa dosadora, medir a quantidade de água indicada na posologia de acordo com a idade do paciente.

**Etapa 2:** Dispensar a água medida na seringa dosadora em um recipiente. (Ex.: xícara de café).



**Etapa 3:** Adicionar ao recipiente a quantidade de gotas do medicamento indicada na posologia de acordo com a idade do paciente e aguardar de 1 a 2 minutos para evaporação do álcool.



**Etapa 4:** Em seguida, preencher a seringa dosadora com o medicamento já diluído em água e distribuir lentamente na boca do paciente, entre a bochecha e a gengiva. Não dispensar mais rápido do que o paciente é capaz de engolir confortavelmente.



**Etapa 5:** Após a administração, lave a seringa com água e guarde-a na respectiva caixa para que possa ser utilizada novamente.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula.

Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista

o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito

nesta bula. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento ENDORUS. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: 0800 724 2022. Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

## 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento. Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

### REFERÊNCIAS:

1. WOLKE, Dieter; BILGIN, Ayten; SAMARA, Muthanna. Systematic Review and Meta-Analysis: Fussing and Crying Durations and Prevalence of Colic in Infants. The Journal of Pediatrics, 2017.
2. SAAVEDRA, Maria, A. et al. Incidência na cólica do lactente e fatores associados: um estudo de coorte. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, vol. 79, nº 02, p. (115-122), 2003.
3. ROBERTS, Donna et al. Infantile colic. American Family Physician, Louisville, vol. 70, nº 04, p. (735-740), Aug, 2004.
4. ZEEVENHOOVEN, Judith et al. Infantile colic: mechanisms and management. Nature Reviews: Gastroenterology and Hepatology, Amsterdam, 2018.

### DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 721, de 1º de julho de 2022.

Farmacêutica Responsável: Camila Cristine de Souza Kuritza  
CRF - PR 28603

**Notificado e produzido por:** Homeopatia Waldemiro Pereira Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba-PR - CEP: 81650-020

CNPJ: 76.440.528/0001-43 - Indústria Brasileira

sac@wplab.ind.br - www.wplab.ind.br

SAC: 41 3013-6464

**Distribuído e comercializado por:** INFAN INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA

NACIONAL S/A. Rodovia BR 232 km 136 - Bairro Agamenon Magalhães

Caruaru/PE - CEP 55.034-640 - CNPJ: 08.939.548/0001-03 - Indústria Brasileira

www.hebron.com.br • hebron@hebron.com.br

SAC: 0800 724 2022

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR,**

**NÃO DESAPARESENDO OS SINTOMAS PROCURE**

**ORIENTAÇÃO MÉDICA.**



HEBRON

V00



RECICLÁVEL